

四庫全書

子部

欽定四庫全書

聖濟總錄纂要卷十四

休寧程林纂

骨蒸傳尸門

虛勞五蒸 骨蒸肺痿 傳尸骨蒸 傳尸勞

虛勞五蒸

論曰虛勞骨蒸者本熱勞之氣熱著氣血深連骨髓侵受五臟久而不已各隨其臟氣之虛熏蒸而為疾 骨

蒸本于腎其證早涼晚熱煩躁寢不安飲食無味小便
色赤喘息無力腰疼脚冷手心常熱蒸盛之時內變為
疳蝕人五臟 脉蒸者本於心其證日增煩悶擲手出
足渴欲飲水唾白沫睡語驚恐脉數蒸盛之時亦變為
疳疳下悶或暴下不止 皮蒸者本於肺其證大喘鼻
乾口燥舌上白胎小便如血蒸盛之時胸滿兩脅下脹
背脾疼臥不安咳嗽毒傷臟則唾血 肉蒸者本於脾
其證體熱如火煩躁無汗心腹膨脹食即欲嘔小便如

血大便秘滯蒸盛之時身腫日赤臥不安 肝蒸者肝
氣虛也肝虛則血無所藏血無所藏肝亦無所養使榮
氣痼竭虛陽內蓄其證外寒內熱亦名內蒸按之附骨
即內熱甚骨肉自消飲食無味皮燥不澤蒸盛之時目
暗妄怒時驚四肢漸細足趺腫起

凡此五蒸與熱勞之病大同小異其治法有不同者蓋
蒸病內著骨髓蒸發皮膚也昔人論蒸有二十三證細
而推之臟腑之病變態多端皆在於虛不必拘之

猪肚黃芪九方 治骨蒸虛勞傳尸肺痿欬嗽不止困

重羸瘦飲食無味頭痛口乾涕唾稠黏渴不止者

猪猪肚

一具以童子小便煮令熱細切焙乾搗為末

知母剉焙

蕪荑

仁

炒各二兩

紫苑去苗

大黃炒

檳榔煨

蒼朮

米泔浸焙

鼈甲

去裙襴醋炙

百部

地骨皮

黃芩

去黑心

桔梗

貝母

柴胡

白茯苓

黃連

龍膽

人參

黃芪各一兩

右十九味搗羅為末鍊蜜九梧子大每服空腹溫酒

下二十九

地骨皮湯方 治五蒸

地骨皮 白茯苓 麥門冬 柴胡 赤芍

各一兩半

藥 甘草

炙令赤
各一兩

右六味搗篩每服五錢水煎食後分溫二服

茯苓湯方 治心蒸苦心驚悚慄男子因讀書損心氣
傷思慮損心吐血心煩多忘失精神或身體瘙痒風癬
或胸中氣滿

白茯苓 麥門冬 款冬花 獨活 檳榔

各六兩

桂 防風 防己

各五兩

甘草

枳殼

四兩

地骨皮

去土十兩

右十一味剉如麻豆大每服五錢以水二盞先煎山
澤銀取水一盞半入藥并生薑半分切大棗三枚擘
破同煎溫服早晨日晚各一

麥門冬飲方 治心蒸心中煩躁手足熱疼欲露其體

驚悸怵惕咽乾虛渴面色萎黃失前忘後婦人血氣衰

弱多傳此疾

麥門冬

二兩

白茯苓

人參

龍齒

遠志

各三

兩

甘草

炙一兩

防風

地骨皮

各三兩

羚羊角

鎊末

一兩

共九味剉如麻豆大每用五錢以水二盞入山澤銀一分棗二枚同煎取一盞分溫二服若大患煩熱渴燥者入淡竹瀝一合煎服若曾經吐血亦治餘如上法一劑無不差

鼈甲湯方 治男子女人骨蒸熱勞皮肉消瘦面痿黃
不思飲食夜多咳嗽涕唾稠黏骨節疼痛憎寒壯熱心
腹氣脹坐臥不安發如瘡狀女人血風勞等疾

鼈甲

去裙襴醋炙
令黃三兩

秦艽 二兩

紫苑 一兩半

柴

胡

三兩

訶梨勒皮

煨一兩半

牡蠣

麻黃

去根節

犀角

知母

升麻

甘草

炙

梔子仁

檳榔

劉

木香

當歸

桔梗

大黃

炒

桑根白皮

劉

黃連

桃仁

炒

人參

桂

姜蕤

芎藭

各一
兩

右二十四味搗篩每服三錢棗一枚烏梅一箇生薑

三片同煎熱服

鼈甲湯方 治虛勞骨蒸肌瘦盜汗潮熱咳嗽或即吐

血肢體倦怠飲食不下及室女勞熱經血不行時發潮

熱煩燥虛渴

鼈甲

九肋大者一枚浸一宿去裙襴
脊骨更蘸醋炙令赤用二兩半

人參 柴

胡

各二
兩

白茯苓

地骨皮

枳殼

生乾地黄

牡丹 百部 芍藥 牛膝 貝母 黃芩 枯

薑根 當歸 山梔仁 桔梗 陳橘皮 麥門

冬 天門冬 紫苑 白朮 桂 去麤皮 桑白

皮 檳榔 各三分 大黃 甘草 炙各半兩 京三稜 一兩

五錢 草豆蔻 五枚 去皮 天靈蓋 酥炙黃一兩

共三十味搗為麤末每服五錢生薑半分棗三枚同

煎稍熱服空心臨臥服

按方中勞證用天靈蓋甚多此物人所不忍其意為傳尸

殺虫也今擇其方可用者亦備一二餘俱不取

鼈甲豬肚丸方 治骨蒸脣紅頰赤氣粗口乾偏身腫

熱或多虛汗大腸秘澀小便赤黃飲食全失

鼈甲

去裙襴
醋炙

柴胡 木香 青蒿 生乾地黃

各一兩

黃連

二兩

青橘皮

去白
半兩

共七味搗羅為末用豬肚一枚去脂膜淨洗入藥末
在內繫定蒸令爛熟入臼杵千百下為丸如菉豆大
每服十五丸溫水下食前日午臨臥各一服

紫雪方 治骨蒸癰疾瘟疫寒熱瘧病五尸五注心腹

絞刺蠱毒魅鬼一切熱毒脚氣悶亂攻衝煩熱口中生

瘡狂陽呌走及解諸毒兼金石草藥熱毒發黃瘧熱疼

痛一切熱病方

與和劑局方略不同

原方黃金壹百兩

金

十五兩

銀

十五兩

寒水石

石膏

磁石

滑

石

各三斤

右四石藥同搗碎後以金銀共六味一處以水一石

煮取一斗去金銀并石滓入後藥味

木香

一兩

犀角

五兩

丁香

四兩

沉香

五兩

甘草

炙

升麻

玄參

各一斤

右七味除前六味外用水三斗煮取一斗絞去滓淨
與前藥汁相和即內芒消五升細研入藥汁漫火同
煎手不住攪之可有一斗餘即投入盆器內盛欲凝
內水飛丹砂末三兩麝香末一兩一分同砂如粉麪
和勻蓋覆之二日成霜雪矣暴乾以新盒或甒內密
封盛貯之有病即取強人服一錢冷水和服以意隨
人強弱增損之脚氣病或增服石藥發動毒悶者服

之水和半錢如神凡服訖即仰臥以物撻腰令高使藥向胸府間若患眼赤及熱痛者以冷水和之點眼大小背初著微痛少時淚出自定日三五次用夜亦如之即無不效口内生熱瘡含如杏核許令消痛止

按局方有硝石即火硝也藥品有追竄之妙深於玄理者知之

骨蒸肺痿

論曰骨蒸肺痿者由榮衛虛損蘊熱熏蒸上焦傳播胸膜使人肺熱葉焦發為肺痿其證咯唾膿血胸滿短氣

欬嗽咽痛寒熱往來不能飲食是也

秦艽扶羸湯 治肺痿骨蒸已成勞嗽或寒或熱聲啞
不出體虛自汗四肢怠惰

軟柴胡

錢二

人參 鱉甲

醋炙

秦艽 當歸 紫

苑 半夏

錢各一

地骨皮

錢半一錢

甘草

五公分

右用水二鍾薑三片烏梅大棗各一枚煎七分食後
服如熱甚者加青蒿汗多者加黃芪去半夏生薑二味
人參養榮湯 治肺痿咳嗽有痰午後熱并聲嘶者

人參

去蘆

阿膠

蛤粉炒

貝母

杏仁

桔梗

茯苓

苓

桑皮

枳實

甘草

已上各一錢

柴胡

二錢

五

味子

十二粒

右水二鍾生薑三片棗二枚煎至一鍾食遠服

保和湯 治骨蒸久嗽肺熱成痿

知母

貝母

天門冬

去心

麥門冬

去心

款冬花

各一錢

天花粉

薏苡仁

炒

杏仁

去皮尖炒各五分

五味子

十二粒

馬兜鈴

紫苑

桔梗

百合

阿膠

炒蛤粉

當歸

百部

各六分

粉草

炙

紫蘇

薄荷

各四分

右水二鍾薑三片煎七分入飴糖一匙食後服吐血
或痰帶血加炒蒲黃生地黃小薊痰多加橘紅茯苓
萎仁喘去紫蘇薄荷加蘇子桑皮陳皮
知母茯苓湯 治肺痿喘嗽往來寒熱自汗

知母

白朮

各八分

茯苓

去皮

五味子

人參

阿膠

各五分

款冬花

桔梗

麥門冬

黃芩

各七分

分

半夏

湯泡七次

柴胡

甘草

炙各一錢

薄荷 川

芎

各五分

右水二鍾薑五片煎至一鍾食後服

傳尸骨蒸

論曰傳尸骨蒸有十二種二十二種三十六種或九十種之異其病皆起於骨蒸內熱或五臟次第相傳而成皆令人寒熱盜汗夢與鬼交遺精白濁髮乾而聾或腹內有塊或腦後有小結復連數箇或聚或散沉沉默默

咳嗽痰涎或咯膿血如肺痿肺癰狀或下利羸瘦自汗盜汗目昏耳鳴飲食無味口内生瘡心煩腰痛五心煩熱朝輕夕重累年積月以至於死死復傳注親屬乃至咸門者是也

五癆麝香散 治男子婦人傳尸骨蒸實熱

天靈蓋 麝香 甘草 東引桃枝 東引柳枝

石榴皮 各一握 青蒿 犀角 半兩 阿魏 柴胡

各一兩 葱白 薤白 各七莖

右十一味除麝香外剉碎同用童子小便二升半浸一宿別入檳榔末三錢同煎至一升半去滓分溫三服男病女煎女病男煎勿令孕婦六畜見初服訖如人行五里又進一服恐惡心可含白梅病在上即吐在下即瀉出各惡物如蟲類及頭髮馬尾狀兼身如蟻行瀉後以葱粥及軟飲補之仍服後方扶神湯調和五臟避風一月若遠年重病不過兩劑其吐下蟲腹紅色可治黑者或差或否白色者不可治也

茯神湯方 治傳尸骨蒸先服麝香散取蟲後服此方

補五臟

茯神 人參 遠志 甘草炙 陳橘皮 當歸

龍齒 熟乾地黄各一兩 五味子 麥門冬 桂

各一兩半 黃芪二兩

石十二味 每服五錢 入棗七枚 生薑五片 同煎空心

溫服日三

珍珠丸方 治傳尸骨蒸咳嗽上氣痰喘寒熱四肢瘦

弱

珍珠末 獺肝 茯神 貝母 柴胡 龍膽

黃連

芍藥

各一兩半

白檳榔

煨

旋復花

各一兩

右十味搗羅為末，鍊蜜和丸，如梧桐子大，每服十五丸，食後溫水下，日再。

黑虎丸方

乾蝦蟆

一枚頭足分為兩段，一半生，一半炙黃。

蛤蚧

一對，各取一半，并去頭泥。

塗酥炙黃

盧會研

天靈蓋

酥炙黃

雄黃

研

白狗糞

秋黃

麝香

研各一分

烏驢蹄

炙乾二兩

乳香

一半

猪膽

一枚取汁于瓶中慢火煨如膏和藥

右十味搗研九味為末合勻細以猪膽膏同粟米飯為丸如梧桐子大先吃熟麪一椀次以茅根香水沐浴次以沙糖麝香少許調冷水一盞投藥一九於星月下浸一宿平旦空腹服之厚被蓋臥應是傳尸冷勞者脊骨中出白蟲或出赤蟲若骨蒸則汗出腰脚疼痛不遂脚下出汗如膠漆諸風氣水病並服一粒若

小兒無事可服半粒如前法有蟲出鼻內如線狀是效

烏雞丸方 治傳尸勞尸注骨蒸眼目昏澁面色青黑

咽喉噎塞痰涕咳嗽或瘰癧攻刺疼痛胸膈滿悶時或

恚怒或多感傷情思不樂夢寐虛驚精藏滑泄失血憎

寒潮熱盜汗肩背拘急腰脊肢節煩疼四肢乏力不喜

飲食小便黃色大便不通乍進乍退服取蟲藥後宜服此

黃連 附子 去皮臍 各二兩 柴胡 白附子 當歸

秦艽 槐膠 甘草 炙 茯苓 酒浸 切焙 續斷 遠

志 巴戟天各一兩 乳香 陳橘皮 雄黃研

丹砂

研各半兩

丁香

乾薑

炮各一分

石十八味搗研極細先養雄烏雞一隻以雄黃三兩為末分作三十分每日拌飯餵月日用大麻子一升銀盡宰治去毛及嘴爪并腸肚留心肝將前藥末入在雞腹內以麻線纏定再用無灰酒一斗銀器石鍋內用文武火煮令雞熟取出除去粗骨將雞并腸內藥同細研更將雞骨焙乾搗羅為末同研藥和入白

中枰千百下九如梧桐子大每服二十九以煖酒吞
下空心日午臨臥各一服

傳尸勞

論曰傳尸勞者骨蒸之病流傳五臟也其證殭殍半臥
半起旦即醒然午後微熱情常不悅心多驚悸夜即盜
汗夢與鬼交兩頰紅赤唇如血色睡不得臥欲食不能
食或喘急咳嗽心胸滿悶背髀煩疼兩目精明四肢無
力脊膂拘急膝脛痠疼兩肋虛脹時或微利鼻乾口燥

漸至尫羸雖死在須臾精神尚爽是其候也治之若緩猶如水涸不覺其死

蘇合香九方 治肺痿客忤鬼氣傳尸伏連殭殍及卒
得心痛霍亂吐利時氣諸瘧瘀血月閉瘕癖水腫驚邪
氣狐魅瘴癘諸疾

蘇合香 白朮 丹砂 沉香 訶梨勒肉 丁
香 木香 莎草根 白檀香 乳香 萆撥

犀角

觔

安息香

各一兩

麝香

研

龍腦

研各半兩

右十五味搗研為末鍊蜜和丸如雞頭實大每服一
丸溫酒或人參湯嚙下一名白朮丸此藥大能安氣
血卻外邪凡疾自內作不曉具名者服此往往得效
雖治氣注氣厥氣逆氣不和吐利榮衛阻塞尤有神
功人家不可無此藥以備急難辟疫尤驗倉卒求人
參不得白湯亦可勿用酒古方雖云用酒酒下口多
不效昔有人病瘵日漸羸消至於骨立肌熱盜汗勞
狀皆具凡服八九兩所苦都差一方用牛黃半兩古

方本無乃後人加之

諸疝門

寒疝 心疝 厥疝 寒疝心腹痛 七疝

蟲病

寒疝

論曰寒疝為病陰冷內積衛氣不行結於腹內故遇寒則發其狀惡寒不欲食手足逆冷繞臍痛白汗出蓬莪茂湯方 治寒疝四肢逆冷氣弱汗出

蓬莪茂

兩一

乾薑

兩半

附子

去皮臍
一兩

芍藥

三分

桂

兩一

白朮

分三

檳榔

兩一

芍藥

兩一

共八味剉如麻豆每服三錢水煎溫服不拘時

人參湯 治寒疝冷痛氣弱汗自出不欲食

人參

白茯苓

各一兩

蜀椒

去目
炒

乾薑

各半兩

附子

去皮臍

檳榔

青橘皮

湯浸
去白

白朮

各一兩

右八味剉如麻豆每服三錢水煎溫服不拘時

烏頭湯 治寒疝蒲逆手足不溫偏身疼痛

烏頭

大者五枚去皮共生用

白蜜

一斤

桂心

二兩

三味先以慢煎蜜及烏頭候蜜減半去烏頭別就一處以水三盞煮桂候減半濾去桂將桂汁共別煎取二盞許服時每用半盞溫服未知再服其知如醉狀得吐為中病也

高良薑湯 治寒疝卒痛積聚不散上衝心胸與陰相引痛則汗出

高良薑

檳榔

木香

當歸

各一兩半

吳茱萸

炒一兩

石五味擣篩每服三錢水煎溫服

心疝

論曰內經謂診得心脉而急病名心疝小腹當有形也
心為牡臟小腸為之使故曰小腹當有形也臟病必傳
于腑今心不受邪病傳于腑故小腸受之為疝而痛小
腹當有形也世之醫者以疝為寒溼之疾不知心氣之
厥亦能為心疝心疝者當兼心氣以治之

當歸湯 治心疝心痛虛冷煩悶

當歸 乾薑 赤芍藥 黃芪 蜀椒去目 人參

半夏為末薑汁作餅子焙乾 附子去皮臍 青橘皮去白 甘

草炙各一兩 厚朴薑汁炙二兩 桂心半兩

右十二味㕮咀如麻豆每服三錢水煎溫服不拘時

候

牡丹丸 治心疝心痛如錐所刺

牡丹皮 桂心 芍藥 烏頭去皮臍 細辛 甘

草炙 木香 吳茱萸湯浸焙乾 檳榔各一兩

右九味擣羅為末鍊蜜為丸梧桐子大每服二十丸溫酒下不拘時

蓬莪茂煮散 治心疝心痛肢體虛冷

蓬莪茂 檳榔 附子 甘草炙 桂心各一兩

胡椒半兩 芎藭 白朮各三分

八味擣羅為散每服二錢水煎溫服

橘皮益智湯 治瘡冷在內陰氣交攻心痛如刺

青橘皮去白 益智去皮 烏頭去臍 威靈儼各一兩去土

右四味剉如麻豆每服三錢生薑三片鹽少許同煎
溫服食前二日

厥疝

論曰內經謂黃脉之至也大而虛有積氣在腹中有厥
氣名曰厥疝女子同法得之疾使四肢汗出當風夫疝
藏疾陰而難見陰沉而伏也今脾虛風寒客于腹膜之
間不能與胃通行水穀之氣結而成積使氣道厥逆而
痛故謂之厥疝也

山茱萸丸 治厥疝上搶心腹冷痛

山萸 吳萸炒 食萸 棟實麩炒 馬蘭花 蘘

香子 青橘皮 橘紅焙 京三稜 乾薑各三分

附子一枚重半兩者去皮臍

右十一味檮羅為末醋煮麩糊和丸如梧桐子大每服二十九酒或鹽湯下空心服

木香湯 治厥疝逆上攻腹冷痛

木香 檳榔 烏頭 細辛 當歸 吳萸炒

枳殼

炒 麩

甘草

炙各
一兩

共八味咬咀如麻豆大每服三錢水煎溫服

寒疝心腹痛

論曰疝者痛也本緣寒氣內積陽衰陰盛不得散釋寒邪因得攻擊或上搶心或腹內疼刺發即俱痛故名寒疝心腹痛也

人參湯 治寒疝心腹痛胸脇支滿不下食汗出嘔逆

人參 白茯苓 檳榔 木香 芍藥 芎藭

當歸

桂心

青橘皮

去白各一兩

共九味每服三錢水煎溫服不拘時

蜀椒湯

治寒疝心腹痛不可忍

蜀椒

去目炒二百粒

附子

一枚去皮臍去

粳米

半盞

乾薑

半兩

半夏

湯洗七遍去滑切捻十二枚

甘草

炙一兩

共六味㕮咀如麻豆每服五錢入生薑半分棗二枚

同煎溫服

地黃湯

治寒疝心腹痛汗出厥冷

生乾地黄

三兩

甘草

炙

白茯苓

人參

當歸

各二兩

羊肉

去脂切
三斤

右六味前五味細剉將羊肉用水二斗煮取汗一斗去羊肉入諸藥煮取七升入葱白一把棗十四枚再煎取六升絞去滓溫服一盞不拘時

當歸湯 治寒疝心腹疼痛裏急

當歸

三兩

生薑

五兩

羊肉

去脂膜切
作片一斤

三味以水一斗煮取五升去滓每服一盞不拘時日三夜一

七疝

論曰疝病有七厥逆心痛足寒飲食即吐者名厥疝腹
中氣滿心下盡痛氣積如臂者名堅疝寒飲則腹中脅
下盡痛者名寒疝腹中乍滿乍減而痛者名氣疝腹中
痛在臍傍者名盤疝腹中痛在臍下有積聚者名附疝
小腹與陰相引而痛大便難者名狼疝凡此七疝皆寒
氣內積血氣凝滯不得通利冷劇則痛故皆謂之疝難
經曰任之為病其內苦結男子為七疝女人為瘕聚益

以此也

桃仁湯 治諸疰

桃仁 去皮尖 雙仁

吳茱萸 炒

陳橘皮 去白

海藻 洗去

鹽

白茯苓 羌活 蒺藜子

炒去角 各三兩

共七味每服三錢生薑一棗大同煎溫服

厚朴丸 治七疰肢體寒臍腹堅痛蒲悶

厚朴 薑汁炙

附子 去皮臍

懷香子 炒

白朮 桂

心 乾薑 枳殼 青橘皮 芎藭 烏頭 去皮臍

木香 當歸

各一兩

右十二味搗羅為末鍊蜜丸如梧桐子大每服二十丸溫酒下薑湯亦可

蠱病

論曰經謂脾風傳之腎病名疝瘕小腹冤熱而痛出白一名蠱夫脾受風邪傳于腎經邪熱內燖故其證小腹冤熱而痛其精失守故其證洩出白液病名曰蠱以邪熱內燖其精不守久而弗治適以喪志也水之精為志

志喪則精從之左傳謂惑以喪志為蠱者如此

大建中湯 治蠱病小腹急痛便溺失精

黃芪 遠志 當歸 澤瀉 各三兩 芍藥 人參

龍骨 甘草 炙各二兩

八味劉如麻豆每服五錢生薑三片棗二枚水煎溫服

澤瀉丸 治蠱小腹冤熱而痛精氣不守溲便白出

澤瀉 補骨脂 炒 巴戟天 五味子 石斛

芍藥 人參 龍骨 甘草 炙各一兩

共八味為末鍊蜜丸如梧桐子大每服三十九溫酒或鹽湯下空心日午臨臥各一服

乾地黄九 治蠱病精氣不守便溺出白小腹寬熱而痛

熟乾地黄

二兩

鍾乳粉

半兩

龍骨

菟絲子

酒浸一宿

別搗

磁石

火煅醋淬七偏

芍藥

黃芩

各一兩

右七味搗羅為末酒煮麴糊丸如梧桐子大每服二十九酒或鹽湯下

陰疝門

陰疝 陰疝腫縮 陰疝卒腫痛 控罩

陰疝統論

論曰疝者痛也邪氣聚于陰令陰器腫大而痛者陰疝也一名癰疝其類有四即腸癰卵脹氣癰水癰是也世俗云疝氣亦云小腸氣或曰膀胱氣原其病本緣腎氣通於陰與膀胱為表裏胞囊者膀胱之候此二經不足下焦受寒皆能致陰卵腫大或發疝痛故通稱為陰疝

若寒溼之氣有連於小腸者即小腸控睪而痛陰凡上
下謂之腸癰寒氣客於經筋足厥陰脉受邪脉脹不通
邪結於陰卵謂之卵脹腎虛之人因飲食不節喜怒不
時津液內溢下流于腎寒氣結聚不散謂之氣癰水氣
盛則津液內結謂之水癰水癰氣癰病生於標故鍼灸
可治其疾易愈腸癰卵脹病生於本邪氣入深其治難差
陰疝

論曰黃帝鍼經曰足厥陰之脉環陰器抵小腹是動則

病丈夫癰疽即陰疽也嗜慾勞傷腎水涸竭無以滋榮
肝氣故留滯內結發為陰疽陰疽之病世俗論陰疽者
為腎餘氣殊不知和實又本於肝經云治法當瀉和氣
之實補肝經之虛

蒺藜子湯 治陰疽

蒺藜子

炒去角

附子

去皮臍

山梔仁

各一兩

右三味㕮咀如麻豆每服五錢水煎溫服食前服

昆布丸 治陰疽腫大偏墜

昆布

洗去鹹

海藻

洗去鹹

蒺藜子

炒去角

蕪荑仁

炒

檳榔

各一兩半

枳殼

去瓤炒

大麻仁

研各二兩

木

香

黃芪

剉

訶藟勒

去核各三分

陳橘皮

去白炒

桃仁

去皮尖雙仁

兔絲子

酒浸一宿別搗各一兩

共十三味搗研為末和勻鍊蜜丸如梧子大每服三十

丸空心食前溫酒或鹽湯下

沙參

治疝氣

沙參

二兩

昆布

洗去鹹

懷香子

炒各半兩

三味為末酒煮麪糊丸如梧桐子大每服二十九空心食前溫酒下

二氣丸 治陰疝上而不下臍腹疼痛

石硫黃

研

黑鉛

各一兩

二味先以鉛於鉚內鎔成汗次下硫黃煙焰透移下候冷取出研為細末糊和丸如梧桐子大每服三十丸酒下

葫蘆巴煮散 治陰疝攻痛

葫蘆巴 沉香 馬蘭花 蓬莪茂煨 懷香子

炒各一兩半 練實取肉炒 木香 薑黃 檳榔剉 桂

心各一兩 附子去皮臍三分 甘草炙半兩

共十味搗羅為散每服三錢水酒同煎空心食前溫服
葫蘆巴九 治陰疝氣攻疼痛

葫蘆巴 補骨脂炒 白豆蔻去皮 草薢 青橘

皮 懷香子 附子去皮臍 肉蓯蓉酒浸 兔絲子

牛膝酒浸 桂心 防風各一兩

右十二味為細末酒煮麪糊丸如菜豆大每服二十丸空心生薑鹽湯下

應病丸 治陰疝撮痛不可忍

韭子炒 芎藭

二味等分為末鍊蜜丸如梧桐子大每服三十九空心溫酒下

陰疝腫縮

論曰陰疝腫縮者寒邪客於厥陰之經而陽氣不能自

溫故令諸筋拘急陰罷緊縮而疼痛也肝者筋之合也筋者聚于陰罷而絡于舌本脉不營即筋縮急筋縮拘則引卵與舌故舌卷卵縮也皆厥陰為病也

翅灰散 治陰疝腫縮

雞翅

石匠都用不拘多少燒灰

一味細研為散每二錢溫酒調下不拘時

雄黃洗 治陰疝腫縮

雄黃

研

甘草

各一兩

礬石

研二兩

三味搗研為末每用藥一兩熟湯五升通手洗腫處
良久再煖洗

車前子塗 治陰疝腫縮

車前子

不拘
多少

一味搗羅為末湯調塗腫處

蔓菁子散塗 治陰疝腫縮

蔓菁子

不拘
多少

一味搗羅為散溫水調塗腫處或絹帛傅之以差為度

陰疝卒腫痛

論曰陰卒腫痛者腎氣虛弱暴受邪氣傳入陰中冷熱相薄故卒然而痛也痛甚則邪勝邪勝則熱熱勝則腫皆卒然而作也

雞翎散 治陰卒腫痛

雞翎

一大莖
燒灰

蛇牀子

一兩

二味搗羅為散每服一錢溫酒調下如左邊腫即取

雞石翎石邊取左邊翎

木香散 治陰卒腫痛攻注腹脹悶

木香

兩半

赤茯苓

兩一

牡丹皮

分三

防風

兩半

檳

榔

兩一

澤瀉

分三

郁李仁

一兩

湯浸

去皮炒

七味擣羅為散溫酒調下

雄黃淋洗

治陰腫

前方同

雄黃

白礬

甘草

炙各一兩

三味為散每用藥一兩以水一斗煎取三升通手淋洗至冷候汗出差

黑豆熨 治坐久卑溼忽陰囊虛腫氣上築

右方以米醋炒黑豆青布袋盛熨心腹更以椒葱湯
淋熨腰膀厚衣蓋下部然後服諸藥

治陰腫偏著一邊連小腸痛不可忍

右方以蘘香苗葉取汁一斗服之日三四服其滓貼
腫處

控辜

論曰甲乙經曰小腹控辜引腰脊上衝心肺邪在小腸

也又曰小腸病者小腹痛腰脊控睪九而痛夫小腸者連心系屬於脊貫肝肺絡心系其經虛不足則風冷乘間而入邪氣既盛則有厥逆之證其氣上衝肝肺客冷散於胸結于臍控引睪九而不下痛引小腹甚則衝於心胸益其經絡之所系屬然也

蘘香子散 治小腸受邪控睪痛引小腹

蘘香子

炒

華澄茄

棟實

一方用巴豆同炒去豆不用

木

香

各一兩半

葫蘆巴

青橘皮

去白各一兩

檳榔

兩半

共七味為散每服一錢溫酒調下空心食前日二

吳茱萸散 治小腸疝氣牽引臍腹疼痛腰曲不伸

吳茱萸

湯洗炒

棟實

四十枝

巴豆

半兩推令微破三味同炒候入

棟實黃焦色去巴豆茱萸不用棟實去核用

沉香

半兩

木香

馬蘭

花 懷香子

炒各一分

右七味除巴豆茱萸不用外擣羅為散每服二錢炒

葱酒調下空心夜臥發時服

木香丸 治小腸受寒氣控臍牽痛

木香

一兩

石南

肉蓯蓉

酒浸切焙
別為末

牛膝

酒浸切焙

別為末


菖蒲 懷香子

炒

棟實

炒各二兩

共六味除蓯蓉牛膝二味別作末外搗羅為末以酒一升熬蓯蓉牛膝成膏和丸如梧桐子大每服三十丸空心食前以紙裹葱白一寸煨熟細嚼溫酒下



聖濟總錄纂要卷十三

欽定四庫全書

子部

聖濟總錄纂要卷十五

詳校官太醫院吏目臣朱桂

編修臣倉聖脈覆勘

總校官降調編修

臣

倉聖脈

校對官編修

臣

沈清藻

謄錄監生

臣

梁如林

欽定四庫全書

聖濟總錄纂要卷十五

休寧程林纂

大小便門

大小便關格不通

小便不通

小便不禁

大小便統論

論曰脾胃大小腸膀胱者倉廩之本營之居也名曰器
能化糟粕轉味而入出者也蓋營受水穀之真精榮衛

之根源大小腸膀胱得以變化皆營為之本是以小腸為受盛之官水穀之未分也及其化物歸於膀胱而為溺轉於大腸而為糟粕必由氣化則能出矣或陰陽之氣不平寒熱相勝或氣實塞而不通或氣虛損而遺泄或燥而結或熱而秘皆陰陽不和之病也治此者勿概以寒熱為法寒劑滌蕩熱劑枯燥反傷和氣耗其精血津液若關格不通三焦約病責以榮衛之否塞若產後便難與夫老者秘澁之病又以津液不足止可滑以利

之潤以滋之苟蕩以快劑則糟粕不通真氣受弊不可不知也

大小便關格不通

論曰大小便不通者陰陽關格三焦約之病也陰陽和平三焦升降則水穀糟粕以時傳導今陰陽偏盛氣痞于中則榮衛因之以不行故氣結於腹內脹滿不通而大小腸俱閉塞也

芒硝湯方 治關格不通脬腸妨悶大小便不通

芒硝

二兩半

冬葵子

炒三合

滑石

三兩

三味除芒硝外㕮咀每服五錢水煎再入芒硝末半

錢更煎空心溫服

茱萸湯方 治腹脅脹滿關格大小便不通

吳茱萸

湯浸炒

大黃

當歸

桂心

赤芍藥

甘草

炙

芎藭

各二兩

人參

細心

各四兩

桃白皮

一握

乾薑

一兩

雄黃

三分

珍珠末

半兩

與雄黃同

細研

右十三味將十一味搗篩每服三錢水煎再入雄黃
珍珠末一字酒半盞更煎三沸空心服之

車前子湯方 治大小便俱不通

車前子

五兩
生用

木通

四兩

黃芩

郁李仁

湯浸去皮
尖雙仁研

如膏各
三兩

右四味將前三味搗篩與郁李仁拌勻每服五錢入
芒硝半錢同煎服

猪脂酒方 治大小便不通

猪脂

半鷄子
大切

一味以酒一升微煮沸投猪脂更煎二沸分為二度

食前溫服未通再服

髮灰散方 治大小便不通

亂髮

一兩淨
燒灰

一味細研每服三錢溫水調食前服日三以通利為

度

茯苓丸方 治大小便不通

赤茯苓

芍藥

當歸

枳殼

白朮

人參

各五兩

大麻仁

大黃

各三兩

共八味為末鍊蜜丸如梧桐子大每服十五丸至二十丸空心煎茅根湯下

治大小便不通腰脅堅脹蒸下部方

蓮葉

三兩

蔥

三七莖并煎用

皂莢

一挺炙剉

生薑

一兩切

共四味以漿一斗二升煮十餘沸并滓分兩度用旋盛入小臼甕缸中坐缸口上薰蒸冷則易之如未通

再傾藥於桶斛中添熱水坐蘸下部即通

小便不通

論曰腎臟不足氣不傳化膀胱有熱水道不宜故小便不通也令人小腹脹滿其氣上衝心腹膨痞甚則喘急不能升降內經曰膀胱不利為瘕者如此也

滑石散方 治小便淋澀疼痛不通

滑石 海金沙 木通

等分

三味為散每服二錢煎燈心湯調下

松煙散方 治小便不通

墨

上好者小濃
研汁半盞

酒

半盞

葱白

三莖

膩粉

研半錢

四味同煎至七分放溫去葱白頓服即通

獨蒜塗臍方 治小便不通

獨顆大蒜

一枚

梔子仁

三七枚

鹽花

少許

三味爛搗攤紙上貼臍良久即通未通塗陰囊上立通

治小便不通久即成淋方 以琥珀搗研成粉每服二

錢濃煎萱草根汁調下空心或食前服葱湯調下亦

佳

杏仁散方 治卒不得小便

杏仁

去皮尖雙仁二錢

一味炒黃研細末米飲調下立差

牛膝湯方 治小便不通莖中痛及女子血結腹堅痛

生牛膝

根莖葉一握

黃芩

半兩

當歸

一兩

三味細剉每服五錢水煎溫服

桑螵蛸湯方 治小便不通

桑螵蛸

炙三枚

黃芩

二兩

二味細剉用水三盞煎分溫二服相次頓服

治小便不通臍下急痛脹悶欲絕鹽熨方

鹽

二觔

一味鍋中炒令極熱布帛裹熨臍小腹以小便通快為度

石韋湯方 治小便不利

石韋

去毛

瞿麥穗

冬葵子

各二兩

滑石

五兩

共四味搗羅為散每服二錢溫水調食前服

治小便不通方

蓬莪茂

懷香子

茶葉

各半兩

三味搗羅為散水煎入鹽二錢葱白二寸同煎空心

服

小便不禁

論曰內經言膀胱不約為遺溺亦腎虛不能約制水液

故便利多甚則下焦傷竭真氣不固而小便不禁也

蓯蓉丸方

治腎臟虛冷腰膝無力小便不利不禁或

溺白色

肉蓯蓉

淨刷去黽皮酒浸二宿薄切焙乾二兩半

杜仲

去粗皮二兩半炙紫色橫

剉黃耆

三兩

韭子

水淘去浮者焙三兩焙乾

桂心

二兩

牛膝

酒浸二兩

山茱萸

二兩

右七味搗羅為細末鍊蜜丸和更入臼內塗酥杵令

勻丸如梧桐子大每日空心煎黃耆湯下三十九至

晚再服

鹿茸散方 治腎臟虛腰膝疼冷夜遺小便

鹿茸

去毛酥炙令黃

烏賊魚骨

去甲炙各三兩

當歸

白芍

藥龍骨

研

人參

桑寄生

各一兩

桑螵蛸

一兩甲劈

破慢火炙令黃

右八味搗前七味為末更與龍骨同研令勻細每服

一錢酒溫調服日三

兔絲子散方 治小便不禁

兔絲子

酒浸一宿焙乾微炒
別研細如粉一兩

蒲黃

炒

黃連

各一

兩半

肉蓯蓉

酒浸一兩

五味子

鷄胞胫黃皮

炙黃
色兩

半

共六味先搗四味為細散再入兔絲子粉與蒲黃同
研勻細每服兩錢酒調食前服日三

黃耆散方

治小便不禁

黃耆

狗脊

去毛

牡蠣

煨

肉蓯蓉

酒浸

切焙

各一兩

萆薢

牛膝

酒浸

赤石脂

研

山茱萸

各二

兩半

土

瓜根

三兩

右九味先搗羅八味為散更與赤石脂同研勻每服一錢酒調食前服至午間夜卧各一服加至二錢

雞腸散方 治小便不禁日夜無數

黃雄雞腸

四具切破淨洗炙黃

肉蓯蓉

酒浸

苦參 赤石

脂

研

白石脂

研

黃連

各五兩

共六味搗四味為散更與赤白二石脂同研勻細每服二錢酒調食前服日二夜一

鵲巢散方 治小便不禁

重鵲巢中草

一斤燒作灰
細研如粉

薔薇根皮

去皮
五兩

二味先搗薔薇根為散每服三錢水煎去滓再入鵲巢灰二三錢空心服

小便利多 小便出血

小便利多

論曰腎者主水膀胱為腑今腎氣不足膀胱有寒不能約制水液令津滑氣虛故小便利多久不差則腎氣傷

憊真元耗損腰脊痠痛身體寒顫羸乏之病生焉

覆盆子丸方

治元臟虛弱臍腹疼痛膝脛少力百節

痠疼昏倦多睡小便頻濁頭旋痰唾背脊拘急飲食無味溫順臟氣補益下經

覆盆子 黃耆 肉蓯蓉 烏藥 五味子 石

斛 補骨脂 澤瀉 萆澄茄 沉香 巴戟天

一兩 芎藭 當歸 赤芍藥 山茱萸 各三分 兔

絲子 酒浸三日 熟乾地黄 兩半

共羅為末鍊蜜和九如梧桐子大每服二十九加至

三十九食前溫酒下米飲鹽湯亦可

補骨脂

巴戟天

去心

桑螵蛸

炒

兔絲子

酒浸三日

別研牛膝

酒浸切焙

乾薑

半兩

熟乾地黄

一兩

枳殼

麩炒

去瓢三分

共搗羅為末酒煮麴糊和九如梧桐子大每服二十

九空心食前溫酒下粟米飲亦可

雌黃丸方 治小便滑數

雌黃

研如粉
一兩半

乾薑

半兩剉入鹽四錢同炒黃色

共搗研為末用乾蒸餅為末入水內拌和搗熟丸如

菉豆大每服十九加至二十九空心鹽湯下

牡蠣丸方 治膀胱虛寒小便數

牡蠣

獨活

狗脊

去毛
三分

肉蓯蓉

一兩

龍骨

半兩

共為末鍊蜜和丸如梧桐子大每服三十九鹽湯下

空心食前

治小便頻數及引飲不止糯米餐方 取純糯米餐一

手大臨卧灸令輒熟啖之以溫酒送下不飲酒人
湯下多啖彌佳行坐良久待心空便卧一夜十餘
行者服之即止或言假火氣溫水道不然也大抵
糯稻止縮水凡人夜飲酒者夜輒不溺此糯米之
力也昔有人病渴殆死有人用糯稻稈及根斬去
穗取中心淨器中燒作灰每用一合許湯一碗沃
浸良久澄去其滓嘗味如薄灰汁乘渴令頓飲之

是夜減飲水七八升此亦糯稻縮水之一驗也

小便出血

論曰內經謂悲哀太甚則胞絡絕絕則陽氣動中數洩血又曰胞移熱於膀胱則癰溺血二者皆虛熱妄溢故洩血不止也治宜去邪熱調心氣

金黃湯方 治小便出血水道中澀痛

鬱金 瞿麥穗 生乾地黄 車前葉 芒硝

滑石

每服五錢匕水一盞半煎至七分去滓溫服不拘

時候

車前葉湯方 治小便出血

車前葉 苗根 黃芩 阿膠 地骨皮 紅藍

花
一兩

每服五錢匕水一盞煎至七分溫服不拘時候

人參湯方 治小便出血

人參 生乾地黄 白芍 桔梗 當歸 甘草

桂心

芎藭

一兩

淡竹茹

二兩

每服四錢匕水二盞煎至一盞溫服不拘時候

阿膠湯方

治腎客熱連心小便出血疼痛

阿膠

黃芩

各三分

甘草

炙半兩

生地黃

統取汁

車前葉

統取汁

藕節

統取汁各四合

生蜜

一鍾

將前藥搗篩同後四味攪勻每一大匙水一盞煎至

七分溫服

栢葉湯方

治小便出血不止

栢葉 甘草 阿膠 黃芩 竹茹 生乾地黄

各一兩

共搗篩每服四錢匕水一篋半同煎至八分去滓溫服不計時候

地黄湯方 治小便出血

生乾地黄 兔絲子

酒浸一宿
曬乾別研

白芷 冬葵子

炒

當歸 芎藭 敗醬 赤茯苓 蔓荊實

蒲黃一兩

共為末煉蜜和丸如梧桐子大每服二十九煎粟米飲下日三服

車前子散方 治小便赤色或小便鮮血

車前子 木通 澤瀉 當歸 桑螵蛸 桂心

滑石 各等分

共為散每服二錢匕煎冬葵根湯下

治小腸尿血方

指甲 半錢 頭髮 一分

二味燒灰研勻空心溫酒調一錢匕頓服

大便秘澀 大便不通 結陰便血

大便秘澀

論曰大便秘澀其證皆榮衛不調陰陽之氣相持也若風氣壅滯腸胃乾澀是謂風秘胃蘊客熱口糜體黃是謂熱秘下焦虛冷窘迫後重是謂冷秘或因病後重亡津液或老弱血氣不足是謂虛秘或腎虛小便過多大腸枯竭渴而多秘者亡津液也或胃實燥結時時作寒

熱者中有宿食也治法須宜和順陰陽然疎風散滯去熱除冷導引補之法不可偏廢當審其證以治之

麻仁丸方 治大便秘難

大麻仁

研膏別搗

大黃

炒各三兩

厚朴

生薑汁炙二兩

枳殼

去瓤麩炒二兩

共搗三味為末與麻仁同研鍊蜜和杵令勻丸如梧

桐子大每服二十九空心溫水下以利為度

麻仁丸方

又方

治三焦不和臟腑虛結胸膈痞悶大便秘

溫

大麻仁

研膏四兩

大黃

半生半熟四兩

白檳榔

山茱萸

兔絲子

酒浸一宿另研

車前子

桂心

羌活

山藥

枳殼

防風

各一兩半

木香

一兩

郁李仁

去皮研膏四兩

共研為末鍊蜜和丸如梧桐子大每服十五丸至二

十丸溫水下

威靈仙丸方

治大腸冷秘

威靈仙

不拘多少

搗為末鍊蜜和丸如梧桐子大每服十五丸生薑米

飲下

附子散方 治大便秘

附子

炮製去皮臍

削去外面留中心如棗大碾為細散蜜水調下一錢

匕

葱膠湯方 治年老虛弱大便秘滯

阿膠

十片

葱

一握

用水二盞同煎膠烱取一盞溫服之立效

大黃九方 治脾胃不和內有蟲滯大便秘難

大黃 赤芍藥

三兩

厚朴

薑汁炙二兩

枳殼

兩半

大

麻仁

別研如膏五合

共搗四味為末與麻仁同研勻鍊蜜和杵丸如梧桐子大每服十九至十五丸食前溫水下以通利為度

滑石散方 治大便不通腹脹氣急妨悶

滑石

細研二兩分二貼

手足指甲

剪患人自身者燒為灰研分二貼

取滑石末一貼以水一盞半煎至八分去滓調爪甲灰一貼空心服至辰再服

葵酥湯方 治大腸閉澀大便不通

冬葵子二合

牛酥

二兩如無猪脂代

將葵子搗篩分四貼每貼以水一盞煎至五分去滓下酥半兩再煎二沸食前冷服

摩臍方 治大便不通腹脹

杏仁

湯浸去皮尖

葱白

三莖去鬚葉細切

鹽分

三味同研如膏每取如酸棗大計心摩臍上三百轉
須臾即利如利不止以冷水洗手即定

治病後津液燥少大便不通腸結方

糯米

二合炒灰
存性研

豬膽

一枚
取汁

沙糖

少許

和研如膏內少許入下部立通

治卒大便不通或熱結或風秘及婦人產後大便不通

等方

皂莢

切去皮炙令
黃熟為末

白梅肉

五枚

蜜

少許

將梅肉并蜜拌和皂莢如棗大以綿紙裹引內下部
中須臾即通

郁李仁粥方 治大便不通

郁李仁

一兩去皮細
研分二服用

煮薄粥一碗臨熟時下郁李仁煮三兩沸傾出空心
吃便通再服一分以通利為度

治下部窒塞大便不通方

烏梅

五枚

內湯中漬，輒取肉熟，搏之，丸如彈子，內下部中，即利。

結陰

便血

詳痔門腸風下血

論曰：經謂結陰者，便血一升，再結二升，三結三升，夫邪在五臟，則陰脉不和；陰脉不和，則血留之，結陰之病，以陰氣內結，不得外行，血無所稟，滲入腸間，故便血也。

地黄煎九方 治結陰便血

生地黄

汁

小薊

汁各一升

沙糖

一兩同上一二味熬成膏

地

榆

阿膠

炙令燥

側柏

各二兩

除以上三味外擣為末入膏中和丸如彈子大每服
一九水一盞煎至六分和水溫服

神僊必效丸方 治便血無度

阿膠

二兩

當歸

焙

烏賊魚骨

去甲

白芍藥

劉

寄奴

各一兩

共為末鍊蜜和丸如梧桐子大空心米飲下三十丸
加至五十丸

龍骨餅子方 治臟毒血不止

龍骨 烏賊魚骨

去甲各等分

為末每服一錢匕入雞清一枚用白麵同和捏作餅
子三枚煑火內煨熟細嚼溫米飲送下空心食前服
石榴散方 治結陰瀉血不止

酸石榴皮 陳橘皮

湯浸去白

甘草 乾薑

炮

四味等分焙乾擣羅為散每服二錢匕陳米飲調下
日三服

地榆散方 治結陰瀉血

地榆

桑耳

甘草

赤芍藥

各三兩

艾葉

三兩

黃芪

六兩

熟地黄

伏龍肝

各四兩

為細散每服二錢匕米飲調下食後臨卧服

金屑丸方 治便血一切血妄行

葉子雌黃

不計多少入在棗內綿繫定蒲煎湯用黑鉛一兩半鎔成汁傾入湯內同煮自

早至晚不住添沸湯取出研細以蠶盛飯上蒸過

以煮藥棗取肉和丸如梧桐子大每服三九煎黑鉛湯下便血甚者三服差矣

金虎九方 治結陰失血

黃蘗

一兩去粗皮用
雞子清塗炙

為末滴水丸菰豆溫水下七丸

諸淋門

卒淋

冷淋

熟淋

氣淋

血淋

膏淋

石淋

勞淋

諸淋統論

論曰膀胱者州都之官津液藏焉氣化則能出矣位處

下焦與腎表裏分別清濁主出而不納若腑臟氣虛寒熱不調使氣不化而水道不宜故為淋閼之病矣 諸淋之證大體緣腎臟氣虛膀胱有熱唯冷淋為異善治此者當熟察之

卒淋

論曰卒淋者緣下焦有熱傳入膀胱其候卒然小腹急痛小便淋澀痛故謂之卒淋蓋下焦在臍下當膀胱上口主分別清濁主出而不納以傳道也今熱在下焦故

其病如此

瞿麥湯方 治卒淋通利小腸

瞿麥

半兩

木通

赤茯苓

陳橘皮

各一兩去白

滑

石

碎一兩半

冬葵子

炒一合

甘草

炙

桑根白皮

各半

兩

共八味搗篩每服三錢入葱白二寸同煎溫服

茅根飲方 治卒淋結澀不通利

茅根

木通

各三兩

石葦

拭去毛

黃芩

冬葵子

當歸 芍藥

滑石

碎各二兩

亂髮

雞子大二握燒灰

共九味搗篩每服三錢水煎溫服不拘時

黃耆飲方

治膀胱虛熱小便卒暴淋澀

黃耆

人參

白茯苓

旱蓮草

滑石

研各一兩

桑白皮

黃芩

枳殼

麩炒

芒硝

共九味搗篩每服三錢水煎溫服

黑金散方

治卒淋不通

好細墨

燒一兩

一味為散每服一錢溫酒調下不拘時候

茯苓湯方 治小便卒淋澀

赤茯苓

三兩

滑石

石韋

去毛

瞿麥穗

蒲黃

各二兩

兩

榆白皮

二兩

冬葵子

二合

共七味擣篩每服五錢水煎溫服食前

冷淋

論曰腎與膀胱為表裏下通於胞宣行水道腎藏虛弱冷氣客於下焦邪正交爭滿於胞內水道不宣故其狀

先寒顫然後便溺成淋謂之冷淋也

拔萁飲方

治冷淋寒顫澀痛

拔萁

土瓜根

黃耆

地骨皮

五味子

各二兩

人參

牡蠣

煨各一兩半

石膏

四兩

共八味搗篩每服五錢水煎溫服

黃耆九方

治腎虛膀胱冷淋不利

黃耆

剉

黃連

土瓜根

各二兩半

玄參

三兩

拔萁

鹿茸

去毛酥炙各二兩

牡蠣

一兩

桑螵蛸

人參

五

味子

各一兩半

右十一味搗羅為末鍊蜜丸如梧桐子大每服二十

丸鹽湯下不拘時

兔絲石脂散 治冷淋

兔絲子

酒浸別研

白石脂

牡蠣

煨研各二兩

桂心

土瓜根

各一兩

右五味研為散每服二錢煮麥粥飲調下空心食前

服

兔絲子散方 治冷淋小便多或不禁

兔絲子

酒浸一宿
別搗一兩

蒲黃

黃連

一兩

硝石

半兩

肉蓯蓉

酒浸
一兩

雞臍脰黃皮

炙一兩
半

五味子

一兩
半

共七味搗羅為散每空腹溫酒調下三錢服日二

熱淋

論曰三焦者水穀之道路也三焦壅盛移熱於膀胱流傳胞內熱氣併結故水道不通利而成淋也其狀溲便赤澀或如血汁故謂之熱淋

滑石散方 治熱淋小便赤澀疼痛

滑石

研三兩

括蔞根

三兩

石韋

炙去毛半兩

三味搗羅為散每服一錢煎小麥湯調下不拘時

車前子散方 治熱淋結澀不通

車前子

炒

牛膝

各一兩

桑根白皮

三兩

蒲黃

一兩

共四味搗羅為散每服二錢煎葱湯調下不拘時

四汁飲方 治熱淋小便赤澀疼痛

蒲萄

自然汁

蜜

生藕

自然汁

生地黃

自然汁各五合

四味和勻每服七分一盞銀石器內慢火煎沸溫服
不拘時候

瞿麥湯方 治心經壅熱小便淋澀赤痛

瞿麥穗

三分

茅根

冬瓜子

各半兩

葵子

木通

一分

黃苓

六錢

竹葉

一把

滑石

研一分為末
分作三貼

共八味除滑石外搗篩分作三劑每貼用水三盞煎
去滓入滑石末一貼攪勻分溫二服食前

氣淋

論曰腎虛則不能制小便膀胱挾熱則水道澀腎虛膀胱熱則胞內氣脹小腹堅滿因至淋澀之疾也其候出少喜數尿有餘瀝亦曰氣癰診其脉少陰脉數者則為氣淋

木通湯方 治氣淋結澀不通

木通

一分

木香

半兩
生用

細辛

一分

草豆蔻

三枚

人

參

半兩
兩

赤茯苓

三分

桃仁

去皮尖雙
仁半兩

肉豆蔻

二枚

殼去

共八味搗篩每服三錢水煎溫服不拘時

桑白皮湯方 治氣淋結澀澀便不利

桑白皮

一兩半

茅根

二兩半

木通

乾百合

各二兩

四味搗篩每服三錢水煎溫服不拘時候

海金沙散方 治氣淋結澀不快

海金沙

別研二兩

滑石

研

甘草

山梔子仁

各一兩

四味將甘草梔子仁為散入餘藥再研勻每服一錢

茶清調下不拘時

通神散方 治氣淋結澀不通

粟米

合一

故筆頭

二枚
燒灰

馬蘭花

七朶
燒灰

三味為散溫酒調下二錢如不可忍者連服三服

貝齒湯方 治因氣成淋小便痛或澀血或如豆汁

貝齒

研一
枚

冬葵花

研半
合

石膏

一兩
半

滑石

一兩

右四味㕮咀如麻豆大每服五錢水煎再入猪肪脂少許再同煎數沸空腹溫服

血淋

論曰心主血氣通小腸與膀胱俱行水道下焦受熱則氣不宣通故洩便癰閉而成淋也熱甚則搏于血脉血得熱則流行入于胞中與洩便俱下故為血淋也

白茅根湯方 治血淋小便出血疼痛

白茅根 芍藥 木通 車前子 滑石
各三兩 碎

黃苓 各一兩半 亂髮 燒灰 半兩 冬葵子 微炒 半兩

共八味疇篩每服三錢水煎溫服日三

雞蘓湯方 治血淋

雞蘓一兩半

石膏碎

淡竹葉切

木通

甘草

生

滑石

小薊根

各一兩

生地黃

半斤

共八味搗篩每服六錢水煎空心服

雞蘓飲方 治血淋不絕

雞蘓苗

竹葉

各二兩

滑石

木通

各五兩

小薊

根

一兩

生地黃

六兩

共六味咬咀如麻豆大每服五錢水煎溫服不拘時

以利為度

治血淋方

車前子葉

生搗汁
三合

生地黃

汁三
合

二味相和煎三沸食前服

膏淋

論曰膀胱為滲泄之腑腎氣均平則溲便清腎既虛不能制其肥液故與俱出色若脂膏故謂之膏淋又曰肉淋

磁石丸方

治膏淋小便肥如膏

磁石

火煨醋淬
三七編

肉蓯蓉

酒浸
切焙

澤瀉

滑石

各一

兩

共四味為末鍊蜜丸如梧桐子大每服三十丸溫酒

下不拘時候

沉香九方 治膏淋

沉香

肉蓯蓉

酒浸

黃耆

瞿麥穗

滑石

磁

石

火煨醋淬三
七編各一兩

右六味搗羅為散末鍊蜜丸如梧桐子大每服三十

九溫酒下不拘時

滑石湯方 治膏淋小便肥濁

滑石 白茯苓 白朮 木通 熟乾地黄 赤

芍藥 五味子

各一兩

共七味搗篩每服三錢水煎溫服不拘時

石淋

論曰淋者淋病而有沙石從小便道出也蓋由腎氣虛損則飲液停聚不得宜通膀胱客熱則水道澀痛胞內

壅積故令結成沙石隨小便而下其大者留礙水道之間痛引小腹令人悶絕也

人參散方 治沙石淋

人參 木通 青鹽

研

海金沙

別研各一分

莎草

根

炒去毛半兩

右五味除海金沙青鹽外搗羅為散合研勻每服二錢空心米飲下

海金沙散方 治沙石淋澀疼痛不可忍

海金沙 滑石 石膏 木通 井泉石 甘

碎

草

灸

右六味等分搗研為散煎燈心湯調下二錢不拘

時候

菝葜散方 治沙石淋重者取出根本

菝葜

二兩

一味為散每服一錢米飲調下服畢用地椒煎湯浴

連腰浸洗

獨聖散方 治沙石淋

黃蜀葵花

炒一兩

一味研為散每服一錢食前米飲調下

木通湯方 治沙石淋

木通 滑石

碎各一兩

冬葵子

二兩

三味擣篩每服五錢水煎溫服

鼈甲散方 治沙石淋

鼈甲

去裙襴燒灰存性

一味擣羅為散每服三錢空心溫酒調下

茅根湯方 治沙石淋

茅根

細切
一斤

葛花

為末
一兩

露蜂房

為末
二兩

三味分作三服每服以水三盞煎溫服

勞淋

論曰人因勞傷腎經腎虛膀胱有熱氣不傳化小便淋瀝水道澀痛勞倦即發故謂之勞淋小腹引痛者是其候也

地黃湯方 治勞淋結澀不通

熟地黄

人參

石韋

各一兩

滑石

三分

桂心

車前子

甘遂

炒

王不留行

冬葵子

炒

木

通

各半兩

共十味搗篩每服三錢水煎溫服不拘時候

兔絲子丸方

治腎勞虛損洩便不利淋瀝不已

兔絲子

酒浸別搗

人參

黃耆

剉

滑石

木通

剉

芍藥

車前子

各一兩

黃芩

三分

冬葵子

一合炒

右九味為細末鍊蜜丸如梧桐子大每服二十九食

前溫酒或鹽湯下日二

石韋散方 治勞淋日夜數起小便不利引陰中痛

石韋

去毛

滑石

瞿麥穗

王不留行

冬葵子

各等

分

右五味為細散每服二錢食前葱白湯調下

九蟲門

九蟲

蛭蟲

寸白蟲

蜣蟲

五臟

蟲

三蟲

九蟲統論

論曰蟲與人俱生而藏於幽隱其為害也蓋本於正氣
虧弱既食生冷復感風邪所以種種變化以至蕃滋初
若不足畏而其甚可以殺人善攝生者薄滋味節嗜欲
蚤去三尸防患於未然彼九蟲亦將銷鑠於冥冥之中
惟未進此道而攘藥則蠹無使滋蔓蓋有藥存焉

九蟲

論曰九蟲一名伏蟲長四分二名虬蟲長一尺三名白

蟲長一寸四名肉蟲狀如爛杏五名肺蟲狀如蠶六名
胃蟲狀如蝦蟇七名弱蟲狀如瓜瓣八名赤蟲狀如生
肉九名蛭蟲狀如菜子至微細者是九蟲皆依乎腸胃
之間若腑臟氣實則不能為害及其虛也發動變化侵
食氣血寢成諸病不可不察也

鷄子九方 治九蟲

鷄子

去殼
二枚

好漆

濾過
四兩

蠟

三兩

粳米粉

半斤

四味先取漆蠟入銅鑪中用慢火煎攪令得所次入

粳米粉又攪令勻煎令凝候可丸即取鐺中置生黃土堆上纔候稍溫即下鷄子又攪令得所再置火上煎令可丸如小豆大宿勿食空腹煎粟米飲下二十丸小兒五丸

石榴枝湯方 治九蟲動作腹中刺痛口吐清水面色黑黃及蟲心痛者

東引石榴枝 三兩 木香 陳橘皮 湯浸去白 吳茱萸

湯洗焙炒各一兩半

大黃 煨

芍藥 各二兩

薏苡仁 二兩半

共七味吹咀如麻豆大每五錢水煎溫服空心

南粉散方 治腹中諸蟲令人腹痛多食泥土及泄者

南粉

二錢
細研

五更初用生油調下至食時蟲出盡

虵蟲

論曰虵即九蟲叙所謂長蟲者今此析而治之蓋較之他蟲害人之為多觀其發作冷氣臍腹撮痛變為嘔逆以至心中痛甚如錐刺昔人謂虵厥貫心能殺人則所

以治之不可緩也

柴胡湯方 治蟲心痛

柴胡 一兩半

當歸

食茱萸

各一兩

芍藥

一兩半

檳榔 三枚

郁李仁

洗去皮三分

厚朴

塗薑汁炙熟一兩

右七味搗篩每服三錢水煎食前溫服日三

桑根白皮湯方 治蛇蟲心痛

桑根白皮

三兩

酸石榴皮

乾者一兩

白蕪荑

炒

檳

榔 炮

厚朴

塗薑汁炙各半兩

右五味搗篩每服三錢入生薑一塊同煎空心服至
晚再服

草薺散方 治虬蟲發作

草薺

炒

白蕪荑

炒

狗脊

去毛剉
各一分

三味為散每服二錢溫酒調下欲服藥先隔宿吃牛
肉乾脯一片次日空心服藥蟲下即差

薏苡根湯方 治虬蟲

薏苡根

一握
去土

一味檮篩水煎分溫二服空心先吃錫少許然後溫服

檮榔煎方 治蛇蟲

檮榔

炮剉五枚

酸石榴根皮

入土五寸東引者去土細剉一斤

二味先將檮榔檮篩與石榴根各均分作三度用每度用水二升半煎至一升絞去滓入粟米一合煮如粥平旦空心頓喫利下蟲即效

蠶蛹汁方 治蛇蟲

蠶蛹

取綠絲蠶蛹四合爛研生布絞取汁空心頓飲之非
繅絲時即須依時收取蠶蛹暴乾擣羅為末用時以
意斟酌多少和粥飲服之

寸白蟲

論曰寸白蟲乃九蟲之一種狀如絹邊葫蘆子因臟
氣虛風寒溼冷伏於腸胃又好食生膾乾肉等所以變
化滋多難於蠲治說者謂食牛肉飲白酒所致特一端

爾亦未必皆緣此

香附九方 治葫蘆蟲

木香

為末一分

附子

生去皮臍為末

硫黃

研各半兩

三味先將蜜陀僧末半兩入醋熬成膏然後入三味藥末一處和丸如小豆大每服十五丸溫酒下食前服

檳榔散方 治寸白蟲

石榴根

陳橘皮

去白

桑根白皮

各一兩

三味細剉分作三服每服水一盞半煎取一盞去滓
五更初調檳榔末二錢至欲明不瀉至晚又一服如
蟲母未下再服或瀉不止喫冷粥止之

食榧實散方 治寸白蟲

生榧實

四十九枚去皮

右一味於每清旦空腹食七枚七日後食盡其蟲即
化成水矣

乾脯湯方 治寸白蟲

乾脯

一片如
手大

石榴根

東引者
一握

右二味並細剉以水四升浸一宿明日平旦煎至一
升去滓分三服空腹先嚼乾脯一片即服藥如人行
十里又一服每服藥後以手按患人腹上藥力易行
其蟲自下凡服藥取月一日至五日已前蟲頭向上
服良

黑鉛散方 治寸白蟲累取不盡久令人面黃心中如
飢

黑鉛沙子

畫家銀塗是也

一味研極細每服二三錢五更初肉汁調頓服至平

明取下蟲立差

玉粉散方 治寸白蟲

定粉

一兩

右一味研極細每服二錢用生麻油調於五更初頓服至晚蟲下

蛻蟲

論曰蛻蟲甚微細若不足慮者然其生化衆多攻心刺
痛時吐清水在胃中侵蝕不已日加羸瘦甚則成痔瘻
疥癬癰疽諸癩害人若此絕其本根勿使能殖則毒而
治之所不可忽

桃皮湯方 治蛻蟲虻蟲及痔鑿蝕下部生瘡

桃木皮

乾者去粗皮

槐子

微炒各一兩半

艾葉

半兩

三味擣篩每服三錢入棗一枚同煎空心食前夜卧
各一服

艾汁方 治蜥蟲攻心如刺吐清水

生艾葉

取嫩心切二分

一味搗絞取汁兩盞許宿不食平旦先嚼乾脯少許後頓飲汁不能盡即兩日服

槐皮丸方 治蜥蟲在胃人漸加羸弱

槐皮

乾者

桃仁

去皮尖雙仁生用

棟實

去核生用各半兩

三味搗羅為末鍊豬膏丸如人指大以綿裹導下部

中

治蜚蟲咬人下部痒方

水銀

一兩

一味用蒸棗膏和丸如人指大綿裹臨卧內下部中
一宿內藥時常留綿帶子在外

熬漆丸方 治蜚蟲在胃令人漸羸

好漆 醇酒

白蜜 各半斤

三味於銅器中和勻微火熬令可丸丸如鷄頭大每
服一九宿勿食空腹溫酒下蟲未下再服

五臟蟲

論曰五臟蟲者緣臟真衰弱熱薰蒸而成之傳所謂肉腐出蟲魚枯生蠹理固如此其名狀之異見於九蟲叙可辨而察也

雷九九方 治心臟勞熱傷心有長蟲名曰蠱長一尺
貫心為病

雷九

灰火
炮過

陳橘皮

湯浸
去白

桃仁

去雙仁皮尖
炒各一兩一分

貫衆

大者去
鬚半兩

狼牙

連苗淨搗
一兩半

白蕪荑

青箱

子炒

乾漆炒令烟出
各一兩

亂髮如鷄子大
一兩燒灰

共九味除亂髮燒灰外八味搗羅為末然後與亂髮
灰同研令勻鍊蜜和更於鐵臼內塗酥杵令勻熟九
如梧桐子大每服空心溫酒下十五九至晚再服米
飲亦得

麥門冬丸方 治肺勞熱生蟲其形如蠶令人欬氣喘
或謂憂膈氣膈患膈寒膈熱膈皆從勞氣所生名曰膏
肓病鍼灸不至

麥門冬

去心
十兩

蜀椒

去目及閉口者
炒出汗一兩

人參

一分兩

遠志

去心

附子

去皮
臍

細辛

各一兩半

甘草

炙一兩半

乾薑

炮一兩

桂心

百部

焙

白朮

黃耆

剉細
各一

兩一分

杏仁

去皮尖雙仁
乾炒令黃半兩

右十三味搗羅為末鍊蜜和更於鐵臼內塗酥杵令

勻熟凡如酸棗子大含化稍稍嚥津

桑根白皮酒方 治肺勞熱生蟲在肺為病

桑根白皮

東引者
取一升

狼牙

其連苗處淨
剉去土三兩

吳茱萸

根皮

東引者淨刷
去土五升

右三味細剉用酒七升煮至二升去滓分作三服每

日空腹一服

茱萸根九方 治肝勞生長蟲為病恐懼不安眼中赤

東引行吳茱萸根

去土
三兩

蠟

三兩

鷄子

五枚去殼
取黃用

粳米

一
盛

右四味除蠟并雞子外各搗羅為末先以銅鍋內煎
蠟鎔即下茱萸末米粉雞子黃煎令煎可丸即丸如

小豆大早晨煎粟米飲下五十九小兒服二十九蟲

出即差

前胡湯方 治脾勞有白蟲長一寸在脾為病令人好

嘔胸中欬欬即嘔而不出

前胡

白朮

赤茯苓

枳殼

去麤
炒

旋復花

去葉

炒

細辛

常山

松蘿

各一兩半

杏仁

去皮尖
雙仁炒

龍膽

去苗各一兩

右十味搗篩每服五錢竹葉十片淨洗細切同煎去

滓空心溫服吐之即差若腹中熱滿入芒硝半錢梔
子仁一兩黃芩一兩半苦參一兩

茱萸根浸酒方 治脾勞熱有白蟲在脾中為病令
人好嘔

吳茱萸根

東引者
一尺

麻子

八升
淨揀

陳橘皮

去白炒
二兩

右三味先擣碎橘皮麻子如泥然後拌茱萸根用酒
一斗浸一宿慢火上微煎絞去滓分作五服每服空
心溫服蟲即下欲合藥時忌言合殺蟲藥

貫衆散方 治腎勞熱四肢腫急有蛻蟲如菜中蟲生於腎中

貫衆

大者三枚去鬚

乾漆

炒令烟出二兩

吳茱萸

水洗七遍焙乾一兩

半

白蘼莢

炒

槐白皮

一兩乾者

杏仁

去皮尖雙仁炒黃半

兩

胡粉

炒令黃色一兩

右七味除別研粉外擣羅為散更與胡粉同研令細
每服二錢空腹用井華水調服日晚再服

三蟲

論曰三蟲亦九蟲之數曰蛭曰赤曰蟯是也其發動諸病較之他種為甚蛭蟲又曰長蟲長一尺動則吐清水心痛貫心則死赤蟲狀長似生肉動則腸鳴蟯蟲至細微形如茱蟲居腸間多則為痔極則為癰或生諸癰疽癰癰癰疥而其變甚多三蟲為患如此古人必析而治之意亦深矣

鼈甲九方 治三蟲發痛面目黃不下食

鼈甲

去裙襖醋炙黃二兩

白朮

一兩半

陳橘皮

去白一兩

木

香 狗脊

去毛各一兩半

檳榔

四兩

吳茱萸

水浸二宿每日三次

換水洗去涎乾炒一兩

右七味搗羅為細末鍊蜜和為劑置臼內入酥杵令勻熟九如梧桐子大每日空腹煎青橘皮湯下三十丸晚食前再服

天門冬煎方 治三蟲保定肺氣去寒熱養肌膚益氣力利水便及諸暴中偏風溼痺強骨髓

天門冬

去心生用十斤

白蜜

七兩

二味先取天冬細切爛搏如泥用酒一斗和絞取汁并蜜攪令勻銅器中重湯上煎仍用竹筴攪候如餲每服如彈丸大空腹溫湯服之或用生地黃汁一盞同煎更妙

亂髮灰散方 治三蟲

亂髮

淨洗如雞子大燒灰

丹砂

研如麤飛過一兩

二味同研極細每服一錢醋調空腹服之

藿蘆散方 治三蟲神效

藿蘆

微炙
二兩

一味搗羅為細散每服二錢隔宿勿食於清旦用羊
肉濃汁調服之蟲自下

檳榔湯方 治三蟲

檳榔

三枚
灰
火煨過

一味搗篩用水三盞煎至一盞半去滓分三服空腹
日午近夜各一服其蟲盡下或葱白鹽豉同煮飲之
亦佳

諸尸門

諸尸

遁尸

飛尸

尸注

諸注門

諸注

風注

走注

鬼注

氣注

卒魔不寤

中惡

卒死

尸厥

鬼魅

鬼擊

諸尸統論

論曰人身中有三尸諸蟲與人俱生常忌血而惡能善

與鬼神通每接引外邪與人為害謂之尸病其狀沈沈
默默不的知所苦而無處不惡或心腹痛脹或礫塊踊
起或攣引腰脊或精神錯雜變狀不一有飛尸者有伏
尸者復有遁尸沈尸風尸之異久不已停注留滯及死
又注易傍人則為尸注之病矣

諸尸

諸尸病因不一其最重者惟五尸若得之疾速如飛走
狀者名飛尸停遁不消者為遁尸沉痼在人臟腑者為

沉尸衝風則發者為風尸隱伏積年不除者為伏尸唯
此五尸之氣變態多端各各不同大率皆令人沉沉默
默痛無常處五尸之外復有尸氣雖各有證然其為病大
同小異而已亦可通一法治之

雄黃九方 治五尸瘕積及中惡心痛蟲注鬼氣

雄黃 丹砂 礬石 牡丹皮 巴豆

去皮心麤
炒研去油

附子 藜蘆

炙去蘆頭
各一兩

共七味為末鍊蜜丸如小豆大每服二丸米飲下食

前服

雄黃九方

方又

治卒中飛尸遁尸沉尸風尸腹痛脹急不

得氣息上衝心胸及攻兩肩或礪塊踊起或攣引脊腰

雄黃

研

大蒜

各一兩

二味爛搗丸如彈子大每服一丸熱酒化下須臾未

差更服尸疹者常宜預收此藥

惡氣散方 治五尸鬼注百毒

桂心 乾薑

二味搗羅為散每服三錢炒鹽一錢溫水同調下

疾藜子九方 治中五尸腹急痛不喘息上衝心胸及

攻兩脅或礪塊踊起攣縮引腰脊

疾藜

炒去角
二兩

一味為末鍊蜜丸如小豆大每服二十九食後水下

遁尸

論曰遁尸謂尸伏埋染注連滯在於胸腹育膜之間尋
常如無病若因喜怒不節飲食傷動其隱之疾發則心

腹脹痛連及胛脅氣喘促急不得安卧者是其証也

木香湯方 治初得遁尸鬼注心腹中刺痛不可忍

木香

分三

鬼箭羽

兩一

桔梗

兩一

丁香

分三

陳橘皮

去白炒
一兩

紫蘓

莖葉微炒
一兩

當歸

兩一

白檳榔

火煨
十四

枚

桃仁

湯浸去皮去雙仁
炒黃色十四枚

右九味搗篩每服五錢水煎溫服日二服不計時候

蒸熨方 治遁尸飛尸及風毒腫流入頭面四肢

芥子

蒸熟焙
一斤

一味為末以鉛丹二兩拌之分作兩處用陳布袋盛之更換蒸熟以熨痛處

飛尸

論曰飛尸者其狀令人心腹刺痛氣息喘急脹滿上衝心胸是也此病忽然而至疾如飛走故謂之飛尸

走馬散方 治飛尸入腹脹滿刺痛氣息喘急

巴豆

二枚去皮心

杏仁

二枚去皮

二味以綿纏椎令極細投熱湯二合指取白汁分三

服飲之食頃當下老小量加之

雄黃散方 治一切飛尸鬼注身痛如刺

雄黃

甘草

炙

黃芩

各半兩

梔子

芍藥

各一兩

共五味為散每服以溫酒調下二錢再服不拘時

尸注

論曰尸注者尸病注易於人也多因哭泣感染尸氣流注身體令人寒熱淋瀝沉沉默默不的知所苦而無處不惡或腹痛脹滿喘急不得息上衝心胸傍攻兩脅或礫塊

踊起或攣引腰脊或舉身沉重精神不爽每更節令愈
加煩滯不治者死死則注易傍人故名尸注

虎掌丸方 治尸注寒熱往來不思飲食心腹刺痛

虎掌

丹砂

炒各半兩

白茯苓

龍齒

各一兩

蓬莪

茂

煨剉

當歸

各三分

右六味為末用酒煮阿魏麝糊丸如梧桐子大每服
二十九薑烏梅湯下

神效蜜陀僧散方 治臨尸哭泣尸氣入腹沉滯臍臑

有時發動取勞積

蜜陀僧

半斤煨醋汁淘研挫乾取六兩

訶梨勒

不去核生用一兩

京

三稜

煨搗末二兩

三味合研令勻每服二錢用煮麴濃湯下當晚不食

卧一服餘時切餅湯服三夜次夜當下惡物不下第

三夜加生牽牛子末一錢同調下

杏仁九方 治尸注

杏仁

去皮尖雙仁炒

亂髮灰

各一分

二味研勻和丸如小豆大每服五丸豬膏酒調下

諸注統論

論曰諸注者邪氣所注也皆因精神衰弱經絡空虛傷於風寒暑溼飲食勞倦或感生死之氣或挾鬼物之精初為中惡客忤卒死諸尸之類雖或暫差必有邪氣伏於經脉流傳腑臟深入骨髓經久不已皆成注病變狀多端時發時差令人昏悶無不病處若因風寒暑濕之邪所注者則為風寒注涼注冷注溫注之病若因飲食

勞倦之邪所注者則為食注飲注酒注水注之病若因
生死之氣而為其邪所注者則為喪注哭注轉注之病
若因挾鬼物之精而為邪所注者則為鬼注邪注尸注
殃注之病犯土禁為注者為土注產後得注者為產注
虛勞所成注為勞注邪氣外浸為泄注凡此諸注以受
病之因為名也邪注于肺則為氣注邪注於勞則為血
注久注不已傷損骨髓則為骨注凡此諸注以病之所
在為名也又有石注者言其牢強如石走注者言其遊

走無常凡此諸注以病之形變為名也名類雖多各有形證合而言之皆注病也治注病者欲辨是非但覆紙於痛處燒髮令焦投於紙上若變粘紙者注氣引之也不粘者非注也審知其因隨證治之無專門者診脉浮大者可治細而數者難治

諸注

論曰諸注者邪氣停而為病也蓋由經絡空虛傷於風寒暑濕或因飲食勞倦或因大病後氣虛邪氣流注或

感死氣或犯鬼邪皆至是疾其狀變易不同各隨其本而治之也

赤芍藥丸方 治五尸注

赤芍藥

一兩

吳茱萸

湯浸焙乾炒

丹砂

研

烏頭

去皮

臍

蜀椒

去目并開口者炒出汗各半兩

乾薑

三分

桂心

一兩

共七味搗羅為末鍊蜜丸如小豆大每服十九空心

溫酒下日三

風注

論曰風注者由體虛風邪之氣客於榮衛邪氣行遊連
滯停注故名風注其狀皮肉掣振痛無常處一年之後
則有頭髮墮落頸項掣痛骨拉解鳴目疼鼻酸牙舛之
證又十二風所注不同溫風所注頭痛欲解髮汗風所
注頭痛體熱骨節兩強柔風所注遊腫在腹或在手脚
水風所注噉食服卧汗出九風所注腦轉肉裂目系痛
惡聞人聲絕風所注暴倒仆口有白沫顛風所注披髮
狂走遇物擊破狂風所注呌呼罵詈獨語談笑奇風所

注口噤面喎四肢不隨糾風所注體生瘡眉毛墮落蚝
風所注癰痺如蚝螫瘡或痒或痛罩風所注舉身戰動
或鼻塞其狀雖異其為邪氣停注則一也

安息香丸方 治一切風注痛

安息香

研

乳香

研各一兩

白膠香

研

地龍

去土炒研

為末各半兩

胡桃仁

研二枚

沒藥

研一分

桃仁

去皮共雙

仁研七枚

共七味同研勻為細末酒煎為丸如彈子大每服一

九溫酒化下

薤活湯方 治風注心腹刺痛上攻胸背

薤活

三分

大豆

炒一合

桑根白皮

一兩半

陳橘皮

去白三分

芎藭

一兩

大腹

并子焙三分

右六味搗篩每服三錢水煎溫服良久再服

走注

論曰走注者風邪客於衛氣也風善行而數變衛氣之行慄疾滑利邪正相搏則淫溢皮膚去來擊痛遊走無常

枳殼丸方 治走注疼痛如錐刺皮膚風氣心腹四肢疼痛

枳殼

去蘊 麩炒

厚朴

薑汁炙 各一兩

犀角

半兩

桑根白皮

一兩

檳榔

二兩

柴胡

一兩

半夏

湯浸焙乾為末 薑汁和作

餅暴 乾

大黃

醋拌炒 各一兩

共八味為末鍊蜜丸如小豆大空心酒下二十九

鬼注

論曰鬼注者忽因鬼邪之氣排擊當時即病心腹刺痛悶絕倒仆如中惡狀餘熱不歇停積彌久有時發動連

滯不已乃至於死死則注易傍人故謂之鬼注

玉壺丸方

治鬼注風冷飲食不消心腹脹滿攻刺心

痛大便不通

治萬病詳千金方外臺秘要

雄黃

研

丹砂

研

礞石

煨

附子

去皮

藜蘆

巴豆

去皮心炒研去油各一兩

右六味為末鍊蜜和丸如小豆大每服二丸米飲下
取快利為度小兒以意減之

八毒丸方

治鬼注中惡心痛積癖蟲注鬼氣

雄黃

研

珍珠

研

礬石

煨

牡丹皮

巴豆

去皮

心炒去油
各一兩

附子

去皮臍
三兩

藜蘆

二兩

蜈蚣

去頭
足炙

一枚

共八味研為末鍊蜜丸如小豆大每服米飲下二丸
得吐為效

太極鰻魚煎方

治鬼注傳尸五勞七傷

鰻魚

寸切洗
淨三斤

附子

一兩去
皮臍

柴胡

三分

芎藭

貝母

去心

鼈甲

去裙襴
醋炙

當歸

切焙

知母

荊芥

穗

各一兩

蕪荑仁

一分

木香

三分

秦艽

青蒿子

小便浸一宿

黃耆

木通

各一兩

共十五味除鰻魚外搗羅為末分作三貼每貼以鰻魚一觔清酒三斤於銀器內煮爛去滓入藥末一貼重煎如稀餚以淨器盛空心溫酒下一錢服了夜用被蓋出汗加至一匙

氣注

論曰氣注者邪氣傳注蘊伏於肺也肺主氣而通行表

裏若為注氣所傳則其病隨氣遊衝擊掣痛上喘奔急
飲食不下是為氣注之候

厚朴丸方 治一切氣注大腸結澀背膊刺痛氣注四
肢及食物不消奔豚氣逆

厚朴

薑汁炙
一兩

桂心

大黃

醋炒各
二兩

桃仁

浸去
皮尖

雙仁炒

三兩

四味為末研勻鍊蜜為丸如小豆大每服三十九米
飲下食後臨卧服微利即效一方加附子一兩去皮

桃仁飲方 治注氣肩膊刺痛不移

桃仁

去皮尖
雙仁炒

酸棗仁

炒

人參

赤茯苓

桂

心

丁香

甘草

炙

共七味等分搗篩每服五錢水煎臨卧頓服

木香散方

治卒注氣

木香

當歸

白朮

桂心

白茯苓

各一兩

共五味搗羅為散每服二錢沸湯點服不拘時日二

卒魔不寤

論曰其寤者魂交其覺也形開老弱數驚恐心氣妄亂精神惛鬱志有搖動則有鬼邪之氣乘虛而入於寢寤使人魂魄飛蕩去離形體故魔不得寤也久不寤以致死必須得人助喚并以方術治之乃蘇若在燈光前魔者是魂魄本由明出喚之無忌若夜暗處魔者忌火照火照則神魂不復入乃至於死又人魔須遠呼不得近而急喚恐神魂或致飛蕩也

小定心湯方 治形體虛羸心氣怯弱多魔善亡

茯神

一兩

甘草

炙

芍藥

乾薑

遠志

人參

桂心

各二兩

右七味剉如麻豆大每服五錢棗二枚同煎溫服日

三

又方

右方以蘆管吹兩耳并其人頭髮二七莖作繩內鼻
孔中割雄雞冠取血以管吹喉咽中大良

治卒魔方

右方以鹽灌之多少在意

又方

右方以雄黃如棗核繫在腋下令人終身不魘

治卒魘不寤方

右方用伏龍肝末或末雄黃或末桂心以蘆管吹入

兩鼻孔中

治卒魘死方

右方以井底泥塗死人目令人垂頭就井呼姓名即

活此法靈異莫測

又方

右方勿以火照俱痛齒其足後跟及足大指爪甲即
活齧其踵不覺者宜用礬石散方見卒死門

中惡

論曰志弱心虛精神失守忤犯邪惡令人心腹暴痛悶
亂如死無所覺知故曰中惡又曰卒忤蓋陰陽否隔氣
道厥逆上下不通陽氣散亂故令人不知也氣還則生

不還則死久不已則變注

麝香散方 治卒中惡心腹刺痛去惡氣

麝香

一分

犀角屑

木香

各半兩

三味研為末散攪勻每服二錢空心熟水調下日再
未止更服

又方

韭根

一握切

烏梅

十四枚

吳茱萸

湯浸焙乾炒二兩半

三味以淨水五升煮以病人櫛內其中三沸櫛浮者

生沉者死煮取三升時飲之

治中惡氣欲絕不省方

右方以皂角生為細末內鼻孔中一方用細卒等分
取屑如胡豆大吹兩鼻

治中惡氣欲絕方

右方取新牛糞絞汁若無新者即以乾者汁服

卒死

論曰卒死者緣人有三虛一謂乘年之衰二謂逢月之

空三謂失時之和賊風鬼邪之氣乘虛而入故令陰氣偏竭於內陽氣阻隔於外二氣壅閉不得升降厥氣上行而暴絕也氣還則復生不還則死內經曰出入廢則神機化滅升降息則氣立孤危蓋謂是也

扁鵲治卒死方

溼牛馬糞絞取汁灌入口中令入喉若口噤者幹開灌之不可灌者扣折一齒下之若無新馬糞以水或人屎和乾者絞取用之

又方

半夏末如大豆許吹鼻中

治卒死而壯熱者方

白礬

半斤

煮令消漬脚令沒踝

治卒死而目閉者方

騎牛臨其面搗薤汁灌耳中又末皂莢吹鼻

尸厥

論曰內經謂邪客於手足少陰太陰足陽明之絡五絡俱竭令人身脉皆動而形無知其狀若尸故曰尸厥蓋五絡皆會於耳中苟為邪所客則其氣逆厥上下暴隔五絡閉結而不通故俱竭而令人狀若尸仆焉治法宜當先刺其足中指爪甲上各一痛後刺大指內側端如韭菜後刺手心至少陰銳骨之端各一痛立已不已以竹管吹兩耳使氣脉疎通內助五絡然後以藥石治之治尸厥脉動而無氣氣閉不通故忽然如死方

右方以菖蒲末吹入兩鼻中又以桂末著舌下

治尸厥方

鬢左角髮方寸燒灰以醇酒一杯飲之不能飲者灌之立已

鬼魅

論曰心者精之合神之舍也心氣不足精神衰弱邪氣乘虛而感則為鬼魅其狀令善怒不常情思如醉或狂言驚怖向壁悲啼夢寐多魘與鬼交通病乍寒乍熱腹

滿短氣不能食診其脉人迎氣口乍大乍小乃鬼魅所持之候也

治妖魅病人不言鬼方

鹿角

鎊屑

一味搗羅為細散每服一錢且言則差

治鬼迷不寤方

雄黃

研如粉

一味吹入病人兩鼻中差

辟諸邪祟附著及小兒驚哭恐悸方

安息香

一味取一皂子大焚令烟起邪自去

鬼擊

論曰精足則神王精耗則神衰精神耗衰血氣虛弱則邪氣易襲故爾邂逅鬼邪相遇則為鬼擊之病其得之無漸卒著人如矛戟所傷令人胸脇腹滿急痛不可按抑或即吐血或下血輕者獲免重者或至不救治宜符

禁之法魚辟邪安正之劑

升麻散方

升麻

獨活

桂心

各半兩

三味為散每服一錢溫酒調下

治鬼排擊方

熟艾

鷄子大三枚

一味以水五盞煎取二盞去滓頓服之

又方

以濃酒吹灌鼻中

又方

以鹽一兩水三盞和攪飲之并以冷水洗之須臾得吐即差

治卒中鬼擊方


鷄冠血

一味漚口中令下咽仍破鷄以搗心下冷即棄於道傍得烏鷄尤佳

欽定四庫全書

聖濟總錄纂要
卷十五

三



聖濟總錄纂要卷十五